

# VASIKA KÕHULAHTISUSE RAVIJUHIS

Koostas: Kerli Mõtus, DVM, PhD

Esimesel elukuul põhjustavad vasikate kõhulahtisust lisaks jootmisest tingitud teguritele erinevad nakkushaigused. Mitmed haigustekitajad võivad esineda üheaegselt. Liigne antibiootikumiravi võib samuti põhjustada vasikate kõhulahtisust, sest soolestiku normaalmikrofloora tasakaal on rikutud. Mitmed kõhulahtisust põhjustavad haigustekitajad esinevad vaid teatud vanuses vasikatel:

	Vasika vanus päevades (peamine haigestumise algusaeg)																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23+
<i>E. coli</i> (bakter)	■	■	■	■																			
<i>Salmonella spp</i> (bakter)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Krüptosporidioos (ainurakne parasiit)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koronaviirus				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotaviirus				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eimerioos (ainurakne parasiit)																				■	■	■	■

## Kõhulahtisuse ravi üldpõhimõtted

- 1) kõrvaldada kõhulahtisuse tõttu tekkinud vedelikukadu ja organismi happeline seisund (elektrolüüdilahused, millesse on lisatud bikarbonaate/atsetaati);
- 2) toetada vasika soolestikus elavat mikrofloorat ja soolestiku limaskesta (probiootikumid, söepastad, linaseemne keedis jne);
- 3) vasika palaviku ja halva enesetunde korral manustada talle põletikku, valu ja palavikku alandavaid ravimeid;
- 4) antibiootikumiravi on lubatud kasutada vaid bakterite poolt põhjustatud kõhulahtisuse diagnoosimise ja antibiootikumitundlikkuse määramise järel. Esmase valikuna valib loomaarst trimetoprim-sulfadiasiini või amokitsilliini süstepreparaadi ning väldib kinoloonide kasutamist.

## Tegevusjuhised vasika kõhulahtisuse avastamisel

Vasika haigestumisel kõhulahtisusse palu loomaarstil võtta roojaproovid kõhulahtisust põhjustavate haigustekitajate kindlakstegemiseks. Antibiootikumiravi määrab loomaarst.

Antibiootikumiravi tohib teha ainult siis, kui kõhulahtisust põhjustab bakternakkus ning vasika üldseisundis esinevad olulised häired (nt palavik). Väldi suukaudseid antibiootikume, sest see häirib tugevalt soolestiku normaalmikrofloorat soodustades kõhulahtisust. Uute haigusjuhtude vältimiseks tuleb karjas kasutada kõhulahtisuse vältimise ja tõrje võtteid. Vastavad soovitusel annab loomaarst.

