

VEISE SÕRAHAIGUSTE RAVIJUHHIS

Koostaja: Kalmer Kalmus, DVM

Veiste lonkamine on põhjustatud valust. Lonke avastamise järgselt ei tohi alustada antibiootikumiravi, vaid veise lonkamist põhjustav sõrahaigus tuleb sõra läbivaatuse teel kindlaks määrata. Seda saab teha ainult lehma fikseerimisel sõravärkimispukis. Tallahaavandist, valgejoonehaigusest ja teistest mitterakkuslikest sõrahaigustest tingitud lonke korral ei ole näidustatud antibiootikumiravi, vaid sõrahaiguse kõrvaldamiseks tuleb kasutada ravivärkimist. Valuvaigistite kasutamine on näidustatud. Bakteriaalsed sõrahaigused on interdigmaalne flegmoon ehk sõramädanik ning digitaalne dermatiit ehk Mortellaro haigus. Sõramädaniku diagnoosimise järgselt on kohene antibiootikumiravi vajalik. Sõrahaiguste tekkepõhjused tuleb karjas kindlaks teha ja kõrvaldada. Bakteriaalsete sõrahaiguste vältimiseks tuleb tagada hea laudahügieen ning läbi viia regulaarset sõrahooldust ning sõradesovanne. Sõradesovannide kasutamine peab olema korrektselt ja õigesti korraldatud.

Tegevusjuhised lonkega looma avastamisel

1. Eralda lehm karjast või märgi.
2. Kutsu võimalikult kiiresti loomaarst või professionaalne sõravärkija, kes:
 - 2.1 fikseerib looma sõravärkimispukis;
 - 2.2 viib läbi korrektse sõrahaiguse diagnoosimise;
 - 2.3 vastavalt diagnoosile teostab professionaalne sõravärkija või loomaarst ravivärkimise. Bakteriaalsete sõrahaiguste korral alustab loomaarst antibiootikumiravi ja valuvaigistava raviga.

