

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ У СВИНЕЙ

Составитель: Юлия Еремеева доктор ветеринарных наук, доктор философии

Воспаление матки у свиней возникает тогда, когда бактерии попадают в матку через открытую шейку. Это может произойти во время опороса, в период после опороса или во время осеменения или спаривания свињи.

Первый признак воспаления матки – это патологические выделения из влагалища. Такие выделения чаще всего можно наблюдать в периоды открытой шейки матки: во время охоты (за несколько дней до появления признаков охоты и во время охоты) и после опороса.

Помимо выделений, наблюдаемых при воспалении матки, у свиней можно диагностировать нормальные выделения, которые можно наблюдать прежде всего в течении нескольких дней после охоты и опороса. Важно различать патологические выделения от физиологических. Нормальные выделения прозрачные или кремово-белые, слизистые и без патологического запаха. Физиологические выделения могут содержать хлопья. При воспалении матки выделения имеют белый, желтоватый, сероватый или зеленоватый цвет и могут содержать кровь. Патологические выделения могут не иметь запаха или при определённых бактериальных инфекциях иметь неприятный запах. Температура тела и общее состояние свиноматки при этом в большинстве случаев остаются нормальными.

Различать физиологические выделения от патологических должен только ветеринар! Выяснив, имеется ли дело с выделениями из матки, влагалища или из мочевыводящих путей, ветеринар назначит курс лечения. Ветеринар назначит лечение антибиотиками только в случаи, если диагноз воспаления матки будет подтверждён. Выбор антибиотиков будет зависеть от бактерий, которые приводят к воспалению матки в данном свиноматке и к каким антибиотикам они чувствительны.

Общие принципы лечения воспаления матки:

- 1) Введение препаратов простагландина, вызывающих сокращения матки. Лечение простагландинами не применяется, если свиноматка супоросная или статус свиноматки после осеменения ещё не определён;
- 2) Применение противовоспалительных и болеутоляющих препаратов;
- 3) Устранение вызванной бактериями инфекции матки антибиотиками. Ветеринар выберет препараты пенициллина или амоксицилина и будет избегать использования цефалоспоринов.

Руководство к действиям при обнаружении выделений из влагалища свињи:

- Вызовите ветеринара, который подтвердит диагноз и назначит верное лечение

Авторские права принадлежат Университету Естественных Наук Эстонии, имущественные права принадлежат заказчику материала. Материал был подготовлен Министерством сельского хозяйства и Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в 2019 году. Все авторские права защищены.



- Лечите свиноматку препаратами, назначенными ветеринаром, используя верную дозу и соблюдая предписанную длительность лечения
- Регулярно проверяйте общее состояние свињи (измеряйте температуру тела, оценивайте аппетит)
- Оцените и при необходимости улучшите гигиену осеменения/спаривания и общую гигиену свинарника
- Не держите свиноматку в станке дольше 4 недель после осеменения
- Попросите ветеринара изучить, какие бактерии вызывают воспаление матки в вашем свинарнике и сделайте тест на чувствительность к антибиотикам




Фото 1 Нормальные выделения из влагалища свињи после опороса (А; В) и после осеменения (С). Автор: Ю.Еремеева



Фото 2. Патологические выделения из влагалища свињи. Автор: Ю. Еремеева

Авторские права принадлежат Университету Естественных Наук Эстонии, и имущественные права принадлежат заказчику материала. Материал был подготовлен Министерством сельского хозяйства и Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в 2019 году. Все авторские права защищены.

